

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY_RETIBOOSTER with Retinol TGF Activator

Retix.C[®]
PROFESSIONAL

Przed wykonaniem zabiegu przeprowadź z klientem konsultację i kwalifikację do zabiegu. Poinformuj o przeciwwskazaniach i zaleceniach pozabiegowych. Zalecamy podpisanie zgody na wykonanie zabiegu oraz wykonanie zdjęć przed i po w celu udokumentowania efektów.

- 1 Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
- 2 Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu **Retix.C PRE-PEEL**
- 3 Rozprowadzać na całej powierzchni skóry twarzy, szyi i dekoltu ampułkę **Retix.C BOOSTER serum** techniką delikatnego masażu. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia.
- 4 Zabezpiecz miejsca wrażliwe i skłonne do podrażnień (kąciaki oczu, skrzydełka nosa, linie brwi, kąciaki ust).
- 5 Zawartość fiołki **Retix.C Retinol TGF Activator** rozprowadź równomiernie przy użyciu pędzelka na całej powierzchni twarzy, szyi i dekoltu. Wykonaj masaż retinolowy Retix.C Shape Lift w celu pobudzenia i stymulacji tkanek głębokich, co wpływa na lepszą absorpcję składników aktywnych.
- 6 Pozostaw roztwór na skórze na czas 6-10h (odpowiednią długość ustala specjalista).
- 7 Po określonym czasie klient zmywa w domu preparat letnią wodą. Nie zalecamy nakładania żadnych preparatów pielęgnacyjnych i makijażu na skórę w dniu wykonania zabiegu
- 8 Zalecana wizyta kontrolna klienta 2-4 dni po zabiegu.

RETIX.BRAZJA™ autorska koncepcja stopniowania intensywności zabiegów retinolowych RETIX.C w zależności od historii zabiegowej pacjenta, rodzaju, kondycji i stopnia tolerancji skóry na retinol i wit.C

POZIOM +1 Jako krok pierwszy wykonaj protokół zabiegowy RETIGLOW – peeling kwasowy

POZIOM +2 Wykonaj protokół RETIBOOSTER, gdzie sterylną ampułkę BOOSTER serum wprowadź techniką mikroiniekcji mikroigłowej. Zalecana głębokość nakłuć to max 0,25mm na skórę okolicy oczu, max do 0,5mm na pozostałych obszarach twarzy


POZIOM +3 Jako krok pierwszy wykonaj protokół zabiegowy RETIGLOW – peeling kwasowy. Następnie wykonaj protokół RETIBOOSTER, gdzie sterylną ampułkę BOOSTER serum wprowadź techniką mikroiniekcji mikroigłowej.

POZOSTAŁE ZALECENIA:

- ✓ SERIA zabiegów powinna składać się z 3 sesji, w odstępie 1 miesiąc.
- ✓ Na 2 tygodnie przed pierwszą sesją zabiegu Retibooster rekomendowane jest stosowanie kremu z retinolem **Retix.C Anti-Aging** (2 razy w tygodniu na noc).w celu przygotowania skóry.


PIELĘGNACJA POZABIEGOWA

- Przez cały okres pomiędzy sesjami zabiegowymi obligatoryjne jest stosowanie kremu ochronnego z wysokim filtrem, np. **Retix.C Fotoprotector SPF 50**.
- Dla złagodzenia stanów zapalnych i wyciszenia skóry poleć stosowanie kremu **Retix.C Ultra Repair Moisturizer** do stosowania 2-3 razy dziennie, 2 dni po wykonanym zabiegu,
- W celu wzmocnienia efektów rozświetlenia, odmłodzenia i rewitalizacji skóry zarekomenduj **Retix.C Glow Booster Serum** 10 dni po wykonaniu zabiegu.



PROTOKOŁY _RETIBOOSTER with Retinol TGF Activator

Retix.C[®]
PROFESSIONAL



RETIX.BRAZJA™

